


あなたは 「くすり」を正しく 飲んでいますか？

RAD-ARカード6

ついうっかり、くすりを包装シートのまま
飲んでしまい、非常に危険な症状を
ひきおこす例が増えています。

くすりは
包装シートと
一緒に飲まないように
注意しましょう!!

包装シート



くすりを押し出す
おしだす



くすりだけを飲む



薬の正しい使い方

内服薬

コップ1杯の水かぬるま湯といっしょにのんで下さい。



点眼剤

汚染をさけるため、容器の先端がまぶたやまつげに触れないようにして1滴さして下さい。

さした後はまぶたを閉じ、まばたきをせずに1～2分間目をつぶって下さい。



軟膏

手指をきれいに洗って、医師より指示のあった部位(症状のある部位)のみにお使い下さい。



坐剤

先のとがった方から肛門の奥へ見えなくなるまで入れて下さい。



医療の専門家の指示のもとでくすりを正しく使用して、一日も早く元の健康をとりもどして元気になってください。どうぞお大事に！

RAD-AR(レーダー)って、な～に？

〔くすりのリスク・ベネフィットを検証する会〕

日本RAD-AR(Risk/benefit Assessment of Drugs Analysis and Responseの略称)協議会とは、日本の主要製薬会社30社で結成された団体です。

この協議会の活動は、くすりが本来もっているベネフィット(効きめや、経済的な効果)とリスク(副作用など)について、科学的に分析して、評価を行い、その結果をもとにくすりが正しく使われ患者さんのお役に立つことを目的としています。

このカードは、くすりが正しく使われ治療の効果が上がることを願って作成したものです。

RAD-AR活動をささえる加盟社

エーザイ	第一製薬	日本ロシュ
大塚製薬	大日本製薬	ノボ ルディスク ファーマ
小野薬品工業	中外製薬	バイエル薬品
キッセイ薬品工業	日本シエーリング	萬有製薬
協和発酵工業	日本新薬	ファイザー製薬
三共	日本チバガイギー	ファルマシア・アップジョン
サンド薬品	日本ヘキスト・	藤沢薬品工業
塩野義製薬	マリオン・ルセル	明治製菓
住友製薬	日本ベーリンガー	山之内製薬
大正製薬	インゲルハイム	吉富製薬
田辺製薬	日本モンサント	

発行：日本RAD-AR協議会

東京都港区虎の門1-4-3 鳳ビル6F 虎の門内藤事務所内

このカードについてご意見などがありましたらお寄せください。

RAD-AR活動についての問合せ先：(株)ファーマインターナショナル

Tel.(03)5992-6793 Fax.(03)5992-6261