

## スマイラフ®を服用される患者さんへ

スマイラフの服用中は、特に次のような症状に注意が必要です。  
体調の変化に気づいたときは、服用をやめてすぐに医師に相談してください。

**服用ごとにこのような体調変化がないか、チェックしましょう。**

- 皮膚に痛み・かゆみ・発疹がある(詳細は下記をご覧ください)
- かぜっぽい
- だるい
- 乾いた咳がでる
- 白目や皮膚が黄色くなる
- 激しい又は持続する腹痛がある
- 手足や全身の筋肉痛・しびれがある
- 尿の色が赤褐色になった
- 熱がある
- 食欲が低下した
- 息切れやめまいがある

### スマイラフ服用中の带状疱疹について

スマイラフの服用中に带状疱疹があらわれる患者さんがいることが報告されています。  
带状疱疹は、治療が遅れると治った後も痛みなどが続くこともあるため、早い時期に抗ウイルス薬による治療を行う必要があります。

早い時期から治療を開始すると、一般的に軽い症状ですみ、治療期間が短くなります。  
皮膚に次のような症状があらわれたら、すぐに医師に相談しましょう。

#### 代表的な皮膚の症状

- 痛み
- かゆみ
- しびれ
- 痛みのある赤みを伴う発疹  
や水疱(水膨れ) など

#### あらわれやすい部位



带状疱疹の詳しい説明は裏面へ


気になる症状が認められた場合は、すぐに医師に相談してください。

## 带状疱疹とは？

带状疱疹は、過去に感染し神経に潜伏していた水痘（水ぼうそう）のウイルスが、何かの原因で免疫が低下した時に再び活性化し、皮膚に痛みや水疱（水膨れ）があらわれる疾患です。症状は神経に沿ってあらわれるのが特徴で、多くは体の左右のどちらかに帯状に広がり、1週間程度でやぶれてかさぶたになります。

## 带状疱疹の痛みと皮膚症状のあらわれ方

带状疱疹は、皮膚の発疹や水疱（水膨れ）などの症状があらわれる1週間ほど前から痛みやかゆみが起こることが多いといわれています。その後、痛みとともに赤みのある発疹や水疱があらわれます。



医療機関名

スマイラフに関する情報は

《スマイラフ.jp患者さんとご家族の方へ》  
からご覧いただけます。

スマイラフ.jp 患者さんとご家族の方へ



<https://smyraf-pts.jp/>  
スマートフォン、パソコンの  
どちらからでもご覧いただけます。



アステラス製薬株式会社

(’22年12月作成)DMC-NK

SMR95001A03