

セロクエルを服用される 患者さんとそのご家族へ

抗精神病剤 日本薬局方

薬価基準収載

クエチアピンプマル酸塩錠、クエチアピンプマル酸塩細粒



セロクエル[®] 25mg錠
100mg錠 細粒50%
200mg錠

劇薬、処方箋医薬品
(注意—医師等の処方箋により使用すること)

Seroquel[®]



セロクエルを服用される患者さんとそのご家族へ

セロクエルを服用されるときは、次のことにご注意ください。

（ご家族に糖尿病の方がいる患者さん、糖尿病になるリスク（血糖値が高い、肥満傾向など）がある患者さんは、とくにご注意ください。）

1 このお薬を服用することにより、血糖値の上昇や体重増加がみられることがあります。

血糖値の変化をみるため、服用されている間は定期的に血糖値の測定を行う場合があります。主治医とご相談ください。

2 服用中に、



などの症状があらわれることがあります。

このような症状に気づいたときは、すぐに主治医または薬剤師にご連絡ください。

3 このお薬は、眠気や立ちくらみ、めまいなどがあらわれることがあります。自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないでください。

その他にも何か気になる症状があらわれた場合は、
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

アステラス製薬株式会社

(20年8月印刷) IS-HA
SEQ95001A01