

経口エストラジオール製剤 エストラジオール錠0.5mg「F」を 服用される方へ

服用前に必ずお読みください

エストラジオール錠とは

エストラジオール錠は、女性の体内にあるエストロゲン（女性ホルモン）の中で最も生理活性の高いエストラジオールを主成分とするお薬です。エストラジオールの補充は、エストロゲン低下によっておこる症状を軽減するとともに、骨量の減少を抑制します。

エストラジオール錠は通常、「更年期障害及び卵巣摘出による卵巣欠落症状に伴うほてり（Hot flush）、発汗及び膣の乾燥感」、「閉経後骨粗鬆症」の治療に用いられます。

※エストラジオール錠0.5mg「F」は、明るい灰黄色の錠剤です。

エストラジオール錠の服用方法

- お薬を飲む量は、効能や症状に合わせて医師が決めます。

更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う症状に使用する場合

通常、成人では、1日1回1錠を服用します。

なお、症状の程度により、1日1回2錠まで増量されることがあります。

閉経後骨粗鬆症に使用する場合

通常、成人では、1日1回2錠を服用します。

※上記いずれの場合もコップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。

- 医師から指示された量を必ず守ってください。異常や違和感がある場合は、速やかに医師または薬剤師に相談してください。

裏面に続く

● **自己判断で服用を中止しないでください。**

自分の判断でお薬を飲むのを止めたり、量を変えたりすると、症状が悪化することがあります。医師の指示どおりに飲み続けることが大切です。

● **お薬を飲み忘れた場合**

もしお薬を飲み忘れた時は、気が付いた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。また、絶対に2回分をまとめて一度に飲まないでください。

服用中の注意事項

- 定期的に乳房検診ならびに婦人科検診を受けてください。
- このお薬を飲み始めてから不正性器出血がおこることがあります。通常は飲み続けているうちになくなりますが、何度もおこったり、長期にわたって続く場合は、医師に相談してください。
- セイヨウオトギリソウを含有する食品は、このお薬の作用に影響しますので、控えてください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

次のような症状があらわれたら、すぐに医師に相談してください。

「下肢のうずくような痛みと腫れ」、「突然の呼吸困難」、「息切れ」、「胸の痛み」、「めまい」、「意識障害」、「手足のまひ」、「急激な視力の低下」などがあらわれることがあります。これらの症状があらわれたら、お薬を飲むのを中止し、すぐに医師に相談してください。