

エベレンゾ錠[®]を服用される患者さんへ

監修 ● 東京大学医学部附属病院
腎臓・内分泌内科 教授・診療科長 南学 正臣 先生
(ご所属・役職名等は2023年12月時点のものです)



エベレンゾ錠は、体内でのエリスロポエチンの産生を増加させ、赤血球を増やすおくすりです。

エベレンゾ錠は、週に3回服用します。

おくすりを飲む曜日や1回に飲む量は、あなたの症状などに合わせて主治医が決めますので、指示に従って水またはぬるま湯で飲んでください。

あなたは、エベレンゾ錠

20mg 錠

50mg 錠 を

100mg 錠

月・水・金

火・木・土

・ ・

に飲みます。

服用する曜日は、ご自身のライフスタイルを振り返り、生活の中にどのように服薬を組み入れるか、主治医と相談して決めましょう。また、服用間隔が同じになるよう、できるだけ一定の時刻に服用してください。

飲み忘れたときは？

エベレンゾ錠を飲み忘れたときは、**決して同日に2回分を服用しないでください。**



あらかじめ定めた日の
服用時間に飲み忘れ

次のあらかじめ定めた日の
服用時間

飲み忘れに気づいた時間が、次のあらかじめ定めた日の服用時間帯と

24時間以上間隔があく場合

24時間以上間隔があかない場合



直ちに服用し、以後は
次のあらかじめ定めた
日に服用してください



服用せず、
次のあらかじめ定めた
日に服用してください



エベレンゾ錠
服用

誤って多く服用したときは？

エベレンゾ錠を誤って多く服用したときは、**すぐに主治医または薬剤師に相談してください。**



体調の変化には注意してください

エベレンゾ錠の服用により、副作用として血栓塞栓症（脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓、シャント※¹閉塞など）がみられる場合があります。下記のような症状がみられた場合は、エベレンゾ錠の服用を中止し、ただちに主治医・薬剤師に連絡してください。



主な症状

脳梗塞

手足のまひやしびれ



しゃべりにくい

など

心筋梗塞や肺塞栓

胸の痛み



呼吸困難

など

シャント※¹閉塞

シャント音の消失・変化



シャント部位の痛み・はれなど

※¹: シャントとは、血液透析を行う際、静脈にたくさんの血液が流れるように、動脈と静脈を直接つなぎ合わせた血管のことです。

厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル〔血栓症（血栓塞栓症、塞栓症、梗塞）〕（2021年4月改定版）

篠田俊雄ほか 監：透析療法パーフェクトガイド（改訂第2版），学研 2017；p94 田部井薫 編：そこが知りたい透析ケアQ&A（第2版），総合医学社 2013；p42-43

服用に関して注意することは？

エベレンゾ錠を服用する際は、他のおくすりと飲み合わせに注意が必要な場合があります。下記のおくすりをお飲みの患者さんは、エベレンゾ錠を服用するにあたって、主治医・薬剤師にその旨をお伝えください。

1 エベレンゾ錠を他のおくすりと同時に服用することで、エベレンゾ錠の作用が減弱する場合があります。



● **リン結合性ポリマー**※³

※³: セベラマー塩酸塩、ピキサロマー

● **多価陽イオンを含有する経口薬剤**※⁴

※⁴: カルシウム、鉄、マグネシウム、アルミニウム等を含む製剤

上記のおくすりをお飲みの患者さんは、

該当のおくすりの服用前後1時間以上間隔をあけて、エベレンゾ錠を服用してください。

2 HMG-CoA還元酵素阻害剤（コレステロールを低下させるおくすり）と一緒にエベレンゾ錠を服用した場合、筋障害など、HMG-CoA還元酵素阻害剤（スタチン）に由来する副作用が起こることがあります。

● **HMG-CoA還元酵素阻害剤（スタチン）** ●