

イナビルには2種類の剤形があります。

●イナビル®吸入懸濁用160mg セット

ネブライザを用いて口から吸う「吸入型」のインフルエンザのお薬です。

医師の指示に従い、吸入しましょう。

*乳糖は含まれていません。



●イナビル®吸入粉末剤20mg

口から吸う「吸入型」のインフルエンザのお薬です。

処方されたらできるだけ早く吸入しましょう。吸入方法の詳細は、「使用説明書」をご覧ください。

*乳糖が含まれていますので、アレルギーのために乳製品を制限している人には注意が必要です。

iPhone無料アプリ『イナビル吸入ガイド!』をご利用ください!

▶ イナビル吸入粉末剤の吸入操作を疑似体験できます。

App Storeで「イナビル吸入ガイド!」を探して、
iPhoneに無料でダウンロードいただけます。



iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

イナビルは、医師から指示された用量を1回分、口から吸うだけで、治療は終了します。
イナビルは、くつろいだ状態（例えば座った状態）で吸入してください。
吸入後は、インフルエンザからの回復のために、翌日以降も安静にし、水分補給と十分な睡眠を心がけましょう。



イナビルおよびインフルエンザに関する情報は
Webサイト『インフル・ニュース』でご覧いただけます!

● PC用webサイト

<https://www.influ-news.info/top.html>

インフル・ニュース

検索

● スマートフォン用webサイト

<https://www.influ-news.info/s/>



医療機関または薬局の連絡先



第一三共株式会社

INA7AT2401

イナビル®を処方されたみなさま、 保護者のみなさまへ

【監修】日本臨床内科医会 インフルエンザ研究班 リサーチディレクター 池松 秀之 先生

川崎医科大学 小児科学 教授 中野 貴司 先生

異常行動について

インフルエンザにかかった時は、

飛び降りなどの「異常行動」をおこすおそれがあります。

(特に発熱から2日間は要注意!)

窓の鍵を確実にかけるなど、異常行動に備えた対策を徹底してください。

〈異常行動による転落等の事故を予防するためのお願い〉

- インフルエンザの患者さんでは、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。
- 異常行動は、
 - ① 就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多い(女性でも報告がある)
 - ② 発熱から2日間以内に発現することが多い ことが知られています。

異常行動 の例

- 突然立ち上がって部屋から出ようとする
- 興奮して窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとする
- 人に襲われる感覚を覚え、外に走り出す
- 突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする
- 自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない
- 変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る など

予防策は中面をご覧ください



異常行動について（続き）

〈異常行動による転落等の事故を予防するためのお願い〉

- 万が一の転落等の事故を防止するため、発熱から少なくとも2日間は、就寝中を含め、特に小児・未成年者が容易に住居外へ飛び出さないために、例えば、以下のような対策を講じてください。

- 玄関や全ての部屋の窓を確実に施錠する
(内鍵、チェーンロック、補助鍵が備え付けられている場合は、その活用を含む)
- ベランダに面していない部屋で寝かせる
- 窓に格子のある部屋がある場合は、その部屋で寝かせる
- 一戸建てにお住まいの場合は、できる限り1階で寝かせる




窓を確実に施錠



ベランダに面していない部屋



窓に格子のある部屋



できる限り1階で

登校・外出について —学校保健安全法施行規則より—



熱が下がった後は**最低2日間(幼児は3日間)**、かつ、**インフルエンザ発症後からは5日間は自宅で療養しましょう!**

ただし、病状により、医師が「感染のおそれがない」と認めた時は、この限りではありません。

例1 ● インフルエンザが発症してインフルエンザのお薬を服用し、**2日目に熱が下がった場合でも…**



例2 ● インフルエンザが発症して**5日目に熱が下がった場合は…**



熱が下がっても、しばらくはインフルエンザウイルスが残っているため、**他の人に感染させる可能性があります。**(主治医の先生の指示に従ってください)




▼記入例

9月10日(金)

発症後 2 日目

8:20 18:40
(38.0℃) (38.4℃)



強い 弱い なし
強い 弱い なし
ふらふらした

イナビルを吸入した日

月 日 ()

2日目

月 日 ()

3日目

月 日 ()

4日目

月 日 ()

5日目

月 日 ()

6日目

月 日 ()

発症日 月 日 ()		発症後 日目			発症後 日目			発症後 日目			発症後 日目			発症後 日目		
測定時間		:	:		:	:		:	:		:	:		:	:	
		() °C	() °C		() °C	() °C		() °C	() °C		() °C	() °C		() °C	() °C	
体温 (°C)	41.0															
	40.0															
	39.0															
	38.0															
	37.0															
	36.0															
	35.0															
症状	せき	強い	弱い	なし	強い	弱い	なし	強い	弱い	なし	強い	弱い	なし	強い	弱い	なし
	身体のだるさ	強い	弱い	なし	強い	弱い	なし	強い	弱い	なし	強い	弱い	なし	強い	弱い	なし
その他																

インフルエンザの
症状を記録しましょう!