
サルコート®カプセル外用50μg を使用されている方へ

小型噴霧器（パブライザー®）の使い方

この噴霧器は、カプセルに入っている粉末のお薬を口腔内へ直接噴霧するためのものです。
※飲み薬ではありませんので、内服しないでください。
表面と裏面の説明をよく読み、正しくご使用ください。





お薬の準備

カプセルを小型噴霧器にセットします



大キャップをはずします。



小キャップをはずします。



カプセルを小キャップの中に入れます。



カプセルの入った小キャップを元どおり取り付けます。

カプセルに穴をあけます



大キャップをもとまでしっかりとかぶせます。

準備完了です



大キャップをもう一度はずせば準備完了です。

裏面に続く

噴霧方法

※吸入剤ではありませんので、吸入しないでください





1. 口をあけ、ノズルの先端部を患部に向けます。
2. 呼吸を止め、ゴム球の押し方を加減しながら患部に向けて噴霧します。
3. ノズルの先端部は、口に触れないようにして下さい。
4. 噴霧後、カプセルは取り出して下さい。

取扱い上の注意

カプセルについて


1. カプセルは1回噴霧するごとに取り出し、廃棄して下さい。
2. カプセルの中にお薬が残っていても、次回は使用しないで下さい。
3. 遮光して室温保存して下さい。
4. カプセルが湿りますと、うまく噴霧できないことがありますので、乾いた指でつまむようにして下さい。

噴霧器について

5. 小キャップの内側と、ノズルの奥にたまった粉末は、週1回程度、添付のブラシで清掃して下さい(図①②)。その後、ノズルの方は、噴霧器を硬いものの上で数回たたいて、残っている粉末を取り除いて下さい(図③)。
6. 水洗いしないで下さい。また、内部を湿らさないように注意して下さい。
7. 大キャップの中には、貫通針がありますので注意して下さい。
8. お子様の手の届かないところに保管して下さい。







TEIJIN 帝人ファーマ株式会社　帝人ヘルスケア株式会社

医薬品 SCT901-AU-2012-5
2020年12月改訂