

トスフロキサシントシル酸塩細粒

小児用15%「タカタ」を服用されている方へ



このお薬は細菌による感染症を治す抗菌薬です。



医師、薬剤師の指示を守って服用してください。

- 服用量・服用方法を守って、飲み残しのないように飲ませてください。
- いちご風味のお薬です。



重複投与を避けるために、複数の医療機関で受診している方は、トスフロキサシントシル酸塩細粒を服用している事を伝えてください。



飲ませ方

- 少量の水または白湯を加えて、よくかき混ぜてから飲ませるか、ペースト状にして、全量を飲ませてください。
- ペースト状にして飲ませた場合は、口の中に残っているお薬を全部飲みこませるために、お薬を飲ませた後に、水または白湯を飲ませてください。
- どうしても飲ませにくいときは、裏面を参考にしてください。
- 飲食物と混ぜる場合には作り置きをせずに、服用させる直前に混ぜてください。

裏もよく読んでね!!



タカちゃん

●飲食物との飲み合わせについて

いちご風味のお薬です。水または白湯で服用させていただきます。
お薬の服用を嫌がり、**どうしても服用できないお子様**には、
下記の飲食物との飲み合わせを参考に服用させていただきます。
なお、多量の牛乳等カルシウムを多く含む飲食物と一緒に服用しますと、お薬の効き目が悪くなるおそれがありますので
ご注意ください。

お子様が好む少量の飲食物（ティースプーン3杯程度）と服用させ、口の中に残ったお薬を全部飲みこませるために水や白湯を飲ませてください。



●トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 15%「タカタ」 飲食物との飲み合わせ

飲みやすさ	飲食物
 飲みやすい	 水または白湯
どうしても 服用できない 場合	 アイスクリーム  プリン  ピーナッツクリーム  さとう 砂糖  ココア ココアパウダー
 飲みにくい	 ジャム類  アップルジュース  オレンジジュース