

しゅ 酒さをロゼックス®ゲル0.75%で 治療される方へ

医師・薬剤師の指示に従ってご使用ください



ロゼックス®ゲルは皮膚の炎症をおさえることで、酒さの発疹や赤みを改善するお薬です。

ロゼックス®ゲルの塗り方

1日2回、患部を洗浄後（朝・夕の洗顔後または入浴後など）、適量を症状の出ている部分にのばして塗ってください。

※目には使用せず、誤って目に入った場合はすぐに水でよく洗い流してください。

※小さいお子さんの手の届かないところに保管してください。



ロゼックス®ゲルの副作用

副作用として、皮膚の炎症や乾燥、かゆみなど、しげき感を伴う症状があらわれた場合は、使用回数を減らすか一時的に使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。また、その他気になる症状があらわれた場合も、医師または薬剤師にご相談ください。

酒さは悪化の原因がさまざまあり、治療を開始してすぐに良くなるわけではありません。症状が良くなったり悪くなったりすることがありますので、根気よく治療を続けることが大切です。

※12週間を超えて使用する場合には医師に相談してください。

ご使用にあたっては以下のことにご注意ください

次にあてはまる方は、 ロゼックス®ゲルを使用できません

(医師・薬剤師に伝えてください)

- このお薬によりアレルギーを起こしたことがある方
- 脳や脊髄の病気のある方(脳腫瘍、脊髄腫瘍を除く)
- 妊娠3ヵ月以内の方

授乳中の方へ

授乳されている方は、授乳しないことが望ましいです。

ロゼックス®ゲルを使用するときの注意点

- お薬の使用中は飲酒を控えてください。
(アルコールの代謝を妨げる可能性があります)
- 日光や日焼けランプの使用はさけてください。
(効果が減弱することがあります)
- このお薬をなめたり、飲んだりしないでください。
- 直射日光、凍結(0℃以下)を避けて室温で保管してください。



ご不明な点がありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。