

ベタニス錠を

服用される患者さんへ

CONTENTS

正常な排尿とは？

2

過活動膀胱とは？

3

ベタニス錠は過活動膀胱における
症状を改善するお薬です

4

ベタニス錠を飲むときには、
次の項目について確認しましょう

6

ベタニス錠は、必ず医師の
指示に従って服用しましょう


7

ベタニス錠 Q&A

8


正常な排尿とは？

おしっこをためておくとき



膀胱の筋肉がゆるみ、尿がたまっていきます。そのとき尿道は尿をもらさないよう閉じています。

おしっこをするとき



膀胱に尿がたくさんたまると、尿をしたい感じが脳に伝えられ、脳は尿を出すように命令します。すると、膀胱の筋肉が縮んで尿道が開き、尿が排泄されます。

過活動膀胱とは？

過活動膀胱では、このような症状があらわれます。



がまんできない
強い尿意



トイレに間に合わず
尿がもれる



トイレが近い




夜、何度もトイレに起きて
よく眠れない

ベタニス錠は過活動膀胱における

● 過活動膀胱のとき

正常な状態では十分な量の尿をためることができますが、過活動膀胱では膀胱の異常な収縮がおこるため、十分な量の尿をためることができません。



尿を十分にためられない











● ベタニス錠のはたらき

ベタニス錠は、膀胱の筋肉をゆるめることで、膀胱に尿をしっかりとめられるようにします。このはたらきによって、過活動膀胱における症状を改善します。

る症状を改善するお薬です

「ベタニス錠」の有効成分は「ミラベグロン」です。

「ベタニス錠25mg」は褐色の錠剤、「ベタニス錠50mg」は黄色の錠剤です。

	ベタニス錠25mg	ベタニス錠50mg
1錠中の有効成分の量	25mg	50mg
製剤写真	<p>●錠剤(原寸大)</p>  <p>おもて面</p>  <p>うら面</p>  <p>そく面</p>	<p>●錠剤(原寸大)</p>  <p>おもて面</p>  <p>うら面</p>  <p>そく面</p>
	<p>●PTPシート</p>  <p>おもて面</p>  <p>うら面</p>	<p>●PTPシート</p>  <p>おもて面</p>  <p>うら面</p>

ベタニス錠を飲むときには、 次の項目について確認しましょう

- 1つでもあてはまる項目があれば、
医師にご相談ください。

以前にお薬を飲んで発疹などが
出たことはありませんか？

心臓の病気はありませんか？

肝臓の病気はありませんか？

現在、妊娠中または授乳中ではありませんか？

現在、他に飲んでいるお薬はありませんか？
(市販薬も含めて)

今後、お子さんを希望される可能性は
ありませんか？



ベタニス錠は、必ず医師の指示に従って服用しましょう

- ベタニス錠は、1日1回、食後に服用してください。
- 包装シート(PTPシート)から取り出して服用してください。
- 水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- お薬を割ったり、砕いたり、すりつぶしたりしないで、そのままかまずに飲んでください。

このお薬は毎日続けて服用することが大切です。医師や薬剤師の指示なしに自分の判断で服用をやめたりしないでください。

**服用中、気になる症状があらわれた場合には
医師、薬剤師に相談しましょう。**

ベタニス錠 Q&A

Q お薬を飲み忘れたら？

A 飲み忘れた翌日に、いつも服用している食事の後に1日分を服用してください。
2日分を1回に服用しないでください。



Q どこに保管すればよいですか？

A 次のような場所に保管しましょう。

- 直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所を避け、なるべく涼しい場所



- 子供の手の届かない場所



病院・医院名

アステラス製薬株式会社

患者さんからの製品に関するお問い合わせを承っております

受付時間/月～金 9:00～17:30(土日・祝日・会社休日を除く)

くすり相談センター ☎ 0120-865-093

(2023年3月作成) IS-Σ

BE095003A05