

プレガバリンOD錠/カプセル「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は一定期間服用を続けることで効き目を発揮する
神経の痛みに対するお薬です。



服用前の注意点

次の方は、医師または薬剤師に相談してください。

- 以前にお薬を服用してかゆみや発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 腎臓に病気のある方、血液透析を受けている方
- うっ血性心不全のある方
- 血管浮腫になったことのある方
- 妊娠または妊娠している可能性のある方
- 他のお薬を服用されている方

服用方法

- 必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。服用を急に中止すると、不眠、頭痛、下痢などの症状があらわれることがあります。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。
- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。OD錠は舌の上へのせ唾液で湿らせて舌で軽くつぶし唾液と一緒に飲み込むこともできますが、苦みを感じることもありますので、少量の水ですみやかに服用することをお勧めします。

- 飲み忘れに気づいた時は、1回分をできるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合は1回とばして次の時間に1回分を服用してください。決して一度に2回分を服用しないでください。
- 誤って多く服用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。

▶服用中の注意点

- このお薬はめまいや眠気、意識消失などがあらわれる場合がありますので、高齢者の方は転倒による骨折等に十分注意してください。また、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作はしないでください。
- 人によっては体重が増える場合があります。体重が増加し始めた場合には、医師または薬剤師に相談してください。
- 視力の低下や眼のかすみなどがあらわれた場合には、医師または薬剤師に相談してください。
- 授乳は避けてください。
- このお薬の服用中はアルコール(飲酒)を控えてください。
- このお薬には併用を注意すべきお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入される場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶副作用の注意点

以下のような症状があらわれた場合にはただちに医師または薬剤師に相談してください。

●めまい



●ねむけ



●気を失う



●息苦しい

●吐き気

●赤褐色尿

●むくみ

●まぶたや唇の腫れ

●冷や汗

●から咳

●発熱

●発疹やみずぶくれ

●白目が黄色くなる

これら以外にも気になる症状があらわれた場合には医師または薬剤師に相談してください。

▶保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人(親、兄弟、姉妹、友人など)に絶対に渡さないでください。