


**イクスタンジを  
服用される患者さんへ**

# イクスタンジを 服用される患者さんへ

- イクスタンジは、前立腺がんを治療するお薬です。  
このお薬は、男性ホルモンの作用をブロックすることにより前立腺がん細胞の増殖をおさえる治療薬です。
- 噛んだり、溶かしたり、割ったりしないで、そのまま飲み込んでください。



- 十分量の水で服用するようにしてください。





## 服用中は、次のようなことに注意してください。

自己判断でお薬の服用を中止しないでください。

主治医に相談することなく、服用の中断、用量の変更、または服用の中止をしないでください。

### 飲み忘れた場合の注意

- その日のうちに飲み忘れに気づいたら  
すぐに1回分だけ服用してください
- 翌日に飲み忘れに気づいたら  
前回分を服用しないで1日分だけ服用してください

次のような症状があらわれたときは  
主治医や薬剤師にご相談ください。

- けいれん発作
- 出血しやすい(歯ぐきの出血・鼻血等)
- 咳、息切れ
- 全身がだるい ● ほてり
- むかむかする ● 食欲がない ● 下痢



※このほかにも気になる症状があらわれたときには主治医や薬剤師にご相談ください。

### 【保管方法】

- 温度や湿度の高い場所を避け、光のあたらない涼しい場所で保存してください。
- 服用直前に包装シートから取り出して服用してください。



(2023年3月作成)INF-KA

アステラス製薬株式会社

XTA95002A02